

Аналіз на антитіла

Коли організм бореться з вірусом, щоб його нейтралізувати, імунна система виробляє антитіла. Їх виявлення дозволяє лікарям підтвердити, чи був конкретний тип вірусу коли-небудь у вашому організмі.



Проведений аналіз не виявив наявності антитіл до HCV?

Не забувайте дотримуватися двох основних порад, щоб уникнути інфікування в майбутньому:



не використовуйте предмети, на яких може знаходитись кров, наприклад, загальні зубні щітки, бритви, електробритви, голки або шприци;



уникайте незахищеного сексуального контакту, при якому можливий контакт крові з кров'ю.



Якщо результат аналізу вказує на виявлення гепатиту С, зверніться до свого сімейного лікаря для отримання направлення в гепатологічну клініку.

Завдяки багатолітнім клінічним дослідженням вдалося розробити терапію, яка дає реальний шанс вилікувати інфекцію, а лікування зазвичай триває 8-12 днів.⁵

Рекомендуйте своїм близьким також здати аналіз. Раннє виявлення гепатиту С дає кращий прогноз для пацієнтів.

Якщо у вас є додаткові запитання щодо того, як передається гепатит С, зверніться до свого лікаря, медсестри чи іншого медичного працівника.

Ви також можете звернутись за підтримкою до Фонду «Gwiazda Nadziei»:
www.gwiazdanadziei.pl.

Більше інформації можна отримати на сайті:
wyleczhcv.pl

i

зателефонувавши на БЕЗКОШТОВНУ гарячу лінію, яку веде Асоціація «Podwale Siedem»
номер телефону: +48 669 050 521*
з понеділка по п'ятницю,
з 16:00 до 20:00.

*вартість дзвінків згідно тарифів оператора
Гаряча лінія працює польською мовою

Матеріал підготовлений на основі медичної консультації
доктора Івони Берешинської

abbvie

AbbVie Polska Sp. z o.o.
ul. Postępu 21 B
02-676 Warszawa

PL-HCV-220009


Вірусний гепатит С

(гепатит С)



abbvie

Що таке гепатит?



Гепатит С - це запалення, спричинене вірусом, який ушкоджує клітини печінки. Через кілька років гепатит може призвести до пошкодження печінки і таких ускладнень, як:

-  **фіброз** (перша стадія формування рубцевої тканини в печінці),
-  **цироз** (ушкодження наступних здорових клітин печінки внаслідок розростання рубцевої тканини).

За оцінками Всесвітньої організації охорони здоров'я у світі налічується близько 71 мільйона інфікованих осіб.



У Польщі найпоширенішими інфекціями є зараження вірусом гепатиту С генотипів 1, 3 і 4⁴. Незважаючи на багаторічні поглиблені дослідження, ефективну вакцину так і не вдалось створити.


Чому варто проходити обстеження?

Гепатит С відомий як «тихий вбивця», оскільки спочатку інфекція зазвичай протікає безсимптомно. Можуть з'явитися неспецифічні симптоми, а саме:

 **втома, біль у суглобах, апатія**

Вірус може не проявлятися протягом кількох десятиліть, руйнуючи за цей час печінку. Тривале захворювання печінки може призвести до цирозу або печінкової недостатності.

Виявлення вірусу в організмі дозволяє застосовувати відповідну терапію, яка призводить до припинення запального процесу і покращення функції печінки.



Хто повинен здати аналізи на гепатит С у першу чергу?

Рекомендується, щоб аналіз на наявність антитіл до HCV, зокрема, здали пацієнти, які:



мають підвищену активність амінотрансфераз



були госпіталізовані принаймні тричі в житті



отримували кров або продукти крові до 1992 р.



мають захворювання печінки або існує підозра на таке захворювання



піддавались медичним і немедичним процедурам, при яких була порушена цілісність шкіри



піддавались діагностичним процедурам, таким як колоноскопія або гастроскопія



вживають або вживали в минулому внутрішньовенні наркотичні препарати

Неможливо заразитись гепатитом С під час виконання звичайних дій, таких як тримання за руки, поцілунки, пиття з однієї склянки або користування одним туалетом з інфікованою людиною.



Посилання:

1. Dore GJ, et al. Estimating HCV disease burden—volume 4 (editorial). J Viral Hepat. 2017;24(Suppl. 2):4-7. <https://doi.org/10.1111/jvh.12763>.
2. Halota W, Flisiak R, Juszczak J, et al. Recommendations of the Polish Group of Experts for HCV for the treatment of hepatitis C in 2020. Clinical and Experimental Hepatology. 2020;6(3):163-169. doi:10.5114/ceh.2020.98606.
3. «Профілактика інфікування вірусом гепатиту С» як приклад комплексних дій у сфері публічної охорони здоров'я для зменшення кількості інфекцій, які передаються через кров, у Польщі; Колективна робота під редакцією проф., д-р габ. Мирослава Яна Висоцького, проф., д-р габ. Анджея Зелінського, д-р габ. Рафала Герчинського; Національний інститут громадського здоров'я – Національний інститут гігієни, Варшава, 2017. 4. Flisiak R, et al. Clin Exp HEPATOL 2016; 2, 4: 144–148; DOI: 10.5114/ceh.2016.63871.
5. Flisiak R, et al. Pol Arch Intern Med. 2020; 130 (2): 163-172; doi:10.20452/pamw.15181