

Badanie przeciwciał

Gdy organizm walczy z wirusem w celu jego unieszkodliwienia, układ odpornościowy wytwarza przeciwciała. Ich wykrycie pozwala lekarzom potwierdzić, czy określony typ wirusa był kiedykolwiek obecny w Twoim organizmie.



Wykonane badanie nie wykazało obecności przeciwciał anty-HCV?

Pamiętaj, aby stosować się do dwóch podstawowych wskazówek w celu uniknięcia zakażenia w przyszłości:



nie korzystaj z przedmiotów, na których może się znajdować krew, np.: ze wspólnych szczoteczki do zębów, maszynek do golenia, golarek elektrycznych, igieł lub strzykawek;



unikaj seksu bez zabezpieczenia, podczas którego może dojść do kontaktu krwi z krwią.



Jeśli wynik badania wskazuje na wykrycie WZW typu C, skontaktuj się ze swoim lekarzem rodzinnym, aby otrzymać skierowanie do poradni hepatologicznej.

Dzięki wieloletnim badaniom klinicznym udało się stworzyć terapie, które dają realną szansę wyleczenia zakażenia, a leczenie trwa najczęściej 8-12 tygodni.⁵

Zachęć swoich bliskich, aby oni również się przebadali. Wcześnie wykryta infekcja WZW typu C daje lepsze rokowania dla pacjentów.

Jeśli masz dodatkowe pytania dotyczące przenoszenia WZW typu C, porozmawiaj z lekarzem, pielęgniarką lub innym pracownikiem służby zdrowia.

Możesz też zwrócić się o wsparcie do Fundacji Gwiazda Nadziei:
www.gwiazdanadziei.pl

Więcej informacji na stronie:
wyleczhcv.pl
oraz

pod numerem BEZPŁATNEJ infolinii prowadzonej przez Stowarzyszenie "Podwale Siedem"

Telefon: 669 050 521*
od poniedziałku do piątku,
w godzinach 16:00-20:00

*koszt połączenie wg taryfy operatora.

Materiał powstał w oparciu o konsultację medyczną
dr Iwony Bereszyńskiej

abbvie

AbbVie Polska Sp. z o.o.
ul. Postępu 21 B
02-676 Warszawa

PL-VHCV-210029


Wirusowe zapalenie wątroby typu C

(WZW typu C)



abbvie

Czym jest WZW typu C?



WZW typu C to zapalenie wywoływane przez wirusa, który uszkadza komórki wątroby. Po kilku latach zapalenie wątroby może prowadzić do jej uszkodzenia i takich powikłań jak:

 **zwłóknienie** (pierwszy etap powstawania blizn w wątrobie),

 **marskość** (uszkodzenie kolejnych zdrowych komórek wątroby przez przyrost blizn).

Światowa Organizacja Zdrowia szacuje, że na świecie jest zakażonych ok. 71 mln osób¹.

W Polsce żyje około

150

tys. osób²
zakażonych
WZW typu C



aż
86%
nie wie o swojej
chorobie³

W Polsce najczęściej występują zakażenia genotypem 1, 3 i 4 wirusa zapalenia wątroby typu C (HCV)⁴. Mimo wieloletnich zaawansowanych badań nie udało się wynaleźć skutecznej szczepionki.


Dlaczego warto się badać?

WZW typu C nazywany jest „cichym zabójcą”, gdyż początkowo zakażenie przebiega zwykle bezobjawowo. Mogą pojawiać się niespecyficzne objawy tj.:

 **zmęczenie, bóle stawów, apatia**

Nawet przez kilkadziesiąt lat wirus może pozostać niewykryty, niszcząc w tym czasie wątrobę. Długotrwały proces chorobowy w wątrobie może doprowadzić do rozwoju marskości lub niewydolności tego narządu.

Wykrycie wirusa w organizmie umożliwia zastosowanie odpowiedniej terapii, która prowadzi do zahamowania procesu zapalnego i poprawy funkcjonowania wątroby.



Kto w pierwszej kolejności powinien wykonać badanie w kierunku HCV?

Wskazane jest, aby badania anty-HCV wykonywane były m.in. u pacjentów, którzy:



mają **podwyższoną aktywność aminotransferaz**



byli **hospitalizowani** przynajmniej 3-krotnie w życiu



otrzymywali **krew lub produkty krwiopochodne** przed 1992 r.



mają rozpoznanie lub podejrzenie jakiegokolwiek **choroby wątroby**



poddawali się **zabiegom medycznym i niemedycznym**, podczas których dochodziło do naruszenia ciągłości skóry



byli poddawani **procedurom diagnostycznym** takim jak np. kolonoskopia czy gastroskopia



używają lub używali w przeszłości **dożylnych środków odurzających**

Referencje:

1. Dore GJ, i in. Estimating HCV disease burden—volume 4 (editorial). J Viral Hepat. 2017;24(Suppl. 2):4-7. <https://doi.org/10.1111/jvh.12763>.
2. Halota W, Flisiak R, Juszczak J, et al. Recommendations of the Polish Group of Experts for HCV for the treatment of hepatitis C in 2020. Clinical and Experimental Hepatology. 2020;6(3):163-169. doi:10.5114/ceh.2020.98606.
3. „Zapobieganie zakażeniom HCV” jako przykład zintegrowanych działań w zdrowiu publicznym na rzecz ograniczenia zakażeń krwiopochodnych w Polsce; Praca zbiorowa pod red.: Prof. dr hab. Mirosław J. Wysocki, Prof. dr hab. Andrzej Zieliński, Dr hab. Rafał Gierczyński; Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego - Państwowy Zakład Higieny, Warszawa 2017.
4. Flisiak R, i in. Clin Exp Hepatol 2016; 2, 4: 144–148; DOI: 10.5114/ceh.2016.63871.
5. Flisiak R, i in. Pol Arch Intern Med. 2020; 130 (2): 163-172; doi:10.20452/pamw.15181

Nie zakazimy się WZW typu C podczas zwykłych czynności, takich jak trzymanie się za ręce, całowanie, picie z tej samej szklanki, czy korzystanie z tej samej toalety co zakażona osoba.

